

El **objetivo** de esta preparación es inducir la diarrea, de manera que se evacue toda la materia fecal y el colon quede completamente limpio, de forma que se pueda visualizar la mucosa intestinal.

Un (1) Día Antes del Examen (dieta)	Un (1) día Antes del Examen. Preparación	Día del procedimiento															
<p><b>El niño(a) debe realizar dieta líquida clara:</b></p> <p>Tomar jugo de melón, aromáticas, suero oral, suero sin colorante sabor a coco o manzana verde, consomé sin papa, sin pollo, sin cebolla y sin cilantro.</p> <p>El niño(a) puede tomar Gatorade y gelatina que no sean de color rojo.</p> <p><b>EL NIÑO(A) NO DEBE NO COMER</b> No comer carnes, pollo y pescado. No consumir arroz, verduras, papa, remolacha. No Consumir granos (frijol, lenteja, arveja) No Consumir lácteos, (Leche, yogurt, avena) No consumir gaseosas, chocolate, café, No consumir bebidas rojas (jugo de mora). No consumir alimentos licuados.</p> <p>Debe tomar suficiente agua de manera que no se deshidrate con la Diarrea y el lavado del colon sea efectivo. Puede reemplazar el agua por suero oral, gatorade, gelatina o sales de rehidratación oral.</p> <p>Sí el niño(a) presenta fiebre o síntomas respiratorios favor avisar antes de iniciar la preparación.</p> <p>La preparación es fundamental para realizar la colonoscopia. En caso que el niño(a) no esté bien preparado, aun continúe con diarrea oscura y restos fecales no se podrá realizar el examen. Se le reprogramará el examen y deberá realizar la preparación adecuada.</p> <p>El niño(a) recibirá anestesia general durante el procedimiento.</p>	<p><b>Paso 1</b> Comprar en la farmacia: <b>TRAVAD PIK</b></p> <p><b>Paso 2</b> Cada Medida (según edad) de <b>TRAVAD PIK</b> se diluye en un (1) vaso de agua al clima. (150 ml). Mezcle durante 3 minutos hasta que se disuelva y tome todo el contenido del vaso.</p>  <table border="1" data-bbox="618 869 1070 1136"> <thead> <tr> <th>Edad</th> <th>Primera Toma</th> <th>Segunda Toma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 a 2 años</td> <td>¼ de sobre a las 8 a.m.</td> <td>¼ de sobre a las 4:00 p.m.</td> </tr> <tr> <td>2 a 4 años</td> <td>½ sobre a las 8 a.m.</td> <td>½ sobre a las 4:00 p.m.</td> </tr> <tr> <td>4 a 9 años</td> <td>1 sobre a las 8 a.m.</td> <td>1 sobre a las 4:00 p.m.</td> </tr> <tr> <td>9 años o más.</td> <td>Preparación de adulto.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Iniciar la primera toma a las 8:00 de la mañana. Posteriormente adminístrele al niño(a) 1 vaso de agua /aromática cada 30 minutos durante las siguientes 8 horas.</p> <p><b>Paso 3</b> La segunda toma <b>Travad Pik</b> debe tomarlo a las 4:00 p.m. Prepare la segunda dosis de la misma manera que hizo con el primero. Posteriormente tome 4 vasos de 250ml de agua/aromática durante 1 hora. 1 Vaso cada 15 Minutos. Después de la 10 p.m. no consuma ningún alimento.</p> <p>Estos medicamentos le inducirán diarrea. La diarrea debe pasar de ser turbia, oscura, contener solidos hasta ser completamente clara y líquida.</p> <p><b>PASO 4</b> Comprar un enema <b>Travad Rectal</b>. Aplicar todo el enema a las 8:00 pm.</p>	Edad	Primera Toma	Segunda Toma	1 a 2 años	¼ de sobre a las 8 a.m.	¼ de sobre a las 4:00 p.m.	2 a 4 años	½ sobre a las 8 a.m.	½ sobre a las 4:00 p.m.	4 a 9 años	1 sobre a las 8 a.m.	1 sobre a las 4:00 p.m.	9 años o más.	Preparación de adulto.		<p>Las deposiciones deben ser claras, sin sedimentos. En caso que persista grumos, materia fecal, debe administrarse otro enema rectal antes de las 8 a.m.</p> <p>El niño(a) no debe NO debe consumir Alimentos antes del procedimiento, debe estar en completo ayuno, (8 Horas) ni caldos, ni aromáticas, nada liquido ni blando.</p> <p>Si toma medicamentos, tomarlos con un sorbo de agua antes de las 6:00 a.m.</p> <p>El niño(a) siempre debe estar acompañado de un adulto responsable.</p> <p>Presentarse a la hora de la cita en CENDITER S.A.S. <b>Confirme en cuál de las sedes será atendido y se le ha asignado su cita.</b> Traer autorización, orden médica, copia del documento de identidad y dinero en efectivo si le aplica realizar el copago.</p> <p>Traer la <b>valoración realizada previamente por el anestesiólogo.</b></p> <p>Disponga de papel Higiénico.</p> <p>Preséntese en adecuadas condiciones de aseo personal.</p> <p>Disponga de un pañal desechable.</p> <p>Disponga de ropa cómoda, fácil de quitar y volver a poner. Zapatos planos y cómodos.</p> <p>El niño(a) No debe traer joyas, relojes, celulares.</p> <p>Disponga de Tiempo suficiente para el procedimiento.</p> <p>Firmar los consentimientos informados que se le entregaran para su lectura y aprobación.</p> <p>Sí la diarrea es abundante debe mantenerse <b>hidratado</b> con suero oral, tomar tanto como pueda.</p>
Edad	Primera Toma	Segunda Toma															
1 a 2 años	¼ de sobre a las 8 a.m.	¼ de sobre a las 4:00 p.m.															
2 a 4 años	½ sobre a las 8 a.m.	½ sobre a las 4:00 p.m.															
4 a 9 años	1 sobre a las 8 a.m.	1 sobre a las 4:00 p.m.															
9 años o más.	Preparación de adulto.																